集驗背疽方

嗣立名迅則通考誤也背疽為患至鉅俗醫剽竊一二丹方或妄施刀針而於受病之源發病之形及夫用藥次第節宣禁忌之所宜俱置不講故天閼者十恒八九今迅所撰於集方之前俱系以論説凡診候之虛實治療之節度無不斟酌輕重辨析毫芒使讀者瞭如指掌中如五香連翹湯内補十宣散加料十全湯加減八味丸立效散之類皆醇粹無

五香連翹湯

木香二分不見火　沉香三分不見火　連翹全者去蒂三分　射干三分　升麻三分　黄耆三分揀無叉附者生用　木通三分去節　大黄微炒半兩剉　甘草半兩生用　丁香半兩揀去枝杖不見火　乳香半兩別碾　麝真者一錢半別碾　桑寄生三分難得真者缺之亦可　獨活三分買老羌活用今鋪家所賣獨活乃是土當歸不堪用

右為麄末和勻每服三大錢水一盞煎至七分去滓服留滓二服用水二盞再煎作一服積四散滓用

水三盞又再煎作一服然後不用其滓一方用銀器煎藥如無銀器入銀一片同煎內桑寄生一味最能療病但難得真者如闕用升麻代令已加升麻若無真桑寄生則升麻分量當倍用

一次合洪氏排膿內補散無嘔逆之證用好酒下有嘔逆之證合用木香湯下此一藥合與癰疽相為終始服餌不可輟

化毒排膿內補十宣散亦名托裏十宣散 治一切癰疽癤瘡

未成者速敗已成者速潰敗膿自出無用手擠惡肉自去不犯刃仗服藥後疼痛減其效如神按此方原缺今從和劑局方補入

黄耆以綿上来者為勝狀如箭簳長二三尺頭不义者洗淨寸截搥破撕擘以鹽湯潤透用盞盛湯瓶上一炊久焙燥隨衆藥入碾即成細末

人參以新羅者為上擇團結重實滋潤洗淨去蘆薄切乾搏用

當歸取川中来者擇大片如馬尾狀滋潤甜辣芬香者温水洗薄切焙乾各用二兩

厚朴用梓州者肉厚而色紫掐之油出去麄皮切薑汁罨一宿爛熟焙燥不用杜朴

桔梗以有心味苦者為真無心味乾者薺苨也主解藥毒切勿誤用洗淨去頭

术散一服疾安而後已

家傳不換金正氣散　治背疽先感風寒脾氣不正寒熱嘔吐

蒼术揀黃色不爛者先用米泔汁浸夏秋半日春冬一日淨洗再用新汲水浸一宿削去黑皮剉焙與麥麩同炒至色黃香熟去麩用四兩淨　厚朴揀紫色者削去麤皮及中間一重黑心如紙厚要剉三寸長劈作薄片每厚朴五兩淨用生薑五兩淨連皮薄切擣爛同淹一宿以文武火翻覆炙五六次炙至薑滓焦黑刮去薑不用只用厚朴細剉取四兩淨再用薑四兩連皮薄切擣爛同厚朴和一處再淹一宿入銚內用文武火炒至乾用　甘草炙剉去赤皮細削取二兩

淨

陳橘皮買真橘皮以水浸三時久洗去黑塵掠去內白筋與瓤剉焙取三兩淨

右四味同為一處再入火內文武火微炒一次却用紙盛於木板上出火毒

半夏湯泡七次削去黑臍細剉焙乾碾為細末以生薑自然汁和作薄餅子安文武火上炙至黃熟為度取二兩淨

藿香去枝杖取葉用以水淨洗去沙塵有日曬乾無日以微火焙二兩淨

人參一兩去頂細剉焙　木香一兩濕紙裹煨至紙乾為度去紙細剉

白茯苓一兩去黑皮封

右將前四味已炒藥續入後五味半夏藿香等不炒

氣并血氣凝滯而得之其所以發寒熱者先感寒邪脾氣不正痰盛而有此證若下柴胡必瀉肝母既虛而又瀉其子壯礪滋氣氣血已不榮運又服滋氣恒山飲子發吐痰大損脾胃用藥如此可為誤謬愚但令服家傳不換金正氣散祛寒邪正脾氣痰飲自消寒熱不作兼服排膿内補散以木香湯易酒不欲引嘔吐故也服此藥三日寒熱自退嘔吐不作寒熱自止

一癰疽纔破有口便合用豬蹄湯洗其初連日洗五日

安及七八分便當服此藥每日與排膿內托散相間服

黃耆揀不用叉附及蛀者剉作二寸長截拍匾以冷鹽湯濕潤瓦器盛盖甑上蒸三次焙剉用

乾地黃揀肥大滋潤者淨洗焙乾用好餅酒濕潤瓦器盛盖於飯甑上蒸曬如此七次剉焙二味各用一兩淨

當歸去蘆淨洗取自頭至中心一截剉焙乾用自中至尾留合別藥

川芎剉微炒　人參去頂挫焙　白茯苓去黑皮剉焙

甘草炙　白芍藥揀有皮者買無皮是偽者削去皮剉焙用　肉桂削去麄皮剉不見火

天台烏藥如無真者買隆興府大塊者用剉焙　白

不能生肌肉瘡口不合切不可用急澀斂口藥當只用豬蹄湯北艾湯相間洗以神異膏貼之并服排膿內補散

一前方但是居於州縣間有力者能及之若適在鄉原與夫無力以市藥者只可用鷺鷥藤酒一方終始服餌俟其疽破即以神異膏貼之然神異膏所用藥材皆非貴細難得之藥前後用此以醫田夫野老百發百中

大川烏丸　治發背活經絡生肌肉

大川烏（生去皮尖） 當歸 赤芍藥 蘇木（剉炒） 沒藥（生用一兩別研） 乳香（一兩別研） 穿山甲（用蚌粉炒脆去粉二兩）

獨活（合用老羌活今鋪中所賣獨活乃土當歸不可用二兩）

右為細末和勻酒煮麪糊為丸梧桐子大溫酒下三十丸空心下

二烏丸 治發背托裏定痛驅風毒涼血脉

羌活（去苗） 薄荷葉（三兩） 川芎（以上各不見火）

地楡 麻黄（去節） 防風（去蘆） 天麻 白芷

薑連皮使

梔子黄芩湯　治發背瘡潰後因飲食有傷調攝不到發熱不住用以退熱

漏蘆　連翹　山梔子仁　黄芩去心各二兩半

黄耆生用一兩　防風　石韋合使桑白皮自取者　甘草生

犀角生用　人參　苦參　白茯苓各二錢

右以上為麄末每服四錢水一中盞煎至六分去滓温服

蜈蝎散　治癰疽瘡口小而硬貼膏藥而膿不來此為風毒所勝

赤足蜈蚣一條去頭足生用　全蝎三箇去丁爪要有尾者生用

木香一錢

右為細末每用時先以豬蹄湯藥洗疽了以此藥一字許糝於膏藥錢上近瘡口處貼其效如神每用神異膏合先量疽大小塗在紙花上了却用此藥糝於膏藥上要使先到瘡故也若瘡口闊大及不

硬則不必用此

內托黃耆丸　治因用鍼砭傷其經絡白膿赤汁逗流不止

黃耆（八兩生用）　當歸（二兩洗焙）　肉桂（去麄皮）　木香　乳香（別研）　沉香（以上四味各一兩）

右為細末用菉荳粉四兩生薑自然汁煮糊丸如梧桐子大每服五十丸溫熱水下不拘時候

沉麝湯　治發背疽之人生肌斂口不得用躁急之藥

只合用麥飯石膏塗績用好膏貼之瘡口自然斂合如
醫治後時為庸醫用毒藥掩盦或刀割傷内血重者兼
服此

木香　麝香　沉香　藿香葉

連翹

右等分為細末每二錢水一盞煎至七分温服無時

疽疾既已先服取毒之藥又用麥飯石膏塗貼五

七日後病漸減退合服大川烏丸二烏丸驅除餘

草烏頭末

右等分用米醋調貼四圍留中竅調亦得

癰疽不可膏藥貼合論

治些小癰癤結而未成不可用膏藥貼合以藥塗使內自消每用生取鹿角尖於砂盆內同老米醋令俗呼黃子醋濃磨時以鵝翎塗拂於癰癤四圍當中留一口遇乾再塗一二日即內消每覺有些小癰癤疼痛發熱時便用生甘草節不炙不焙用日曬乾若無日焙於籠蓋上

疾者豈可坐受其斃當信而用之

案以上二方一治腦疽一治乳疽皆與背疽無涉以其為李氏之書故併附於此